核准日期：2011年01月28日
修改日期：2012年10月19日
修改日期：2013年03月13日

替米沙坦氢氯噻嗪片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用
运动员慎用

【药品名称】 实验室检查 通用名称：替米沙坦氢氯噻嗪片

偶见下列情况，即血红蛋白降低或血尿酸升高的发生频

本品为复方

组份为：每片含替米沙坦40mg和氢氯噻嗪12.5mg。 氢氯噻嗪 【性状】本品

为双层片。外层为替米沙坦层，显白色或类白色；内层为氢氯噻嗪层，显 氢氯噻嗪可导致或加重血容量不足从而导致电解质失衡（见【注意事项】）。 白色或类白色

与其他血管紧张素Ⅱ拮抗剂一样，在本品治疗期间观察到了血管性水肿，荨麻疹以

用量。隐性糖尿病患者在噻嗪类利尿剂治疗期间可发

实验室检查

在本品临床试验中所观察到的实验室检测结果的变化已包含在上面的内容中（见【注意事项】）。

本品时需调整胰岛素或口服降糖

生显性糖尿病。

噻嗪类利尿剂治疗期间可能会

发生血胆固醇及甘油三酯水平升高，然而，本品中仅

在内的噻嗪类利尿剂均可引起液体或电解质失衡（包括低钾血症、低

替米沙坦的不良反应发生率与安慰剂相似。

钠血症以及低氯性

者以及接受皮质激素或促肾上腺皮质激素伴随治疗的患者发生低钾血症的危险性较高

（如泌尿道感染、包括膀胱炎）

视觉异常、出汗增多

中枢及外周神经系统

不常见： 眩晕

不常见： 关节痛、腿部痉挛或腿痛、腿痛

不常见： 肺炎样症状

不常见： 焦虑

常见： 湿疹样皮肤异常

此外，自从替米沙坦上市以来，所报告的红斑、瘙痒症、衰弱、失眠、抑郁、

呕吐、低血压、心动过缓、

弱以及缺乏疗效的病例很少。

者，过度降压可以引起心肌梗塞或中风。

药物治疗学分组，血管紧张素II受体拮抗剂和利尿剂，ATC编码，C09D A07

